

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ MENINGOKOKOWYCH

Lekarz informuje

Jedyną formą profilaktyki Inwazyjnej Choroby Meningokokowej (ICHM) są szczepienia ochronne.



Zaleca się izolację chorych oraz stosowanie środków ochrony osobistej – m.in.: higienę rąk, unikanie potencjalnych czynników ryzyka, takich jak przebywanie w dużych skupiskach ludzkich.



Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2021, szczepienia przeciwko meningokokom znajdują się w wykazie szczepień zalecanych, niefinansowanych ze środków Ministra Zdrowia. Oznacza to, że rodzic/ opiekun, który chce zaszczepić dziecko, musi sam za nie zapłacić.



Szczepienia zalecane są osobom narażonym na przebywanie w dużych skupiskach, dlatego w pierwszej kolejności profilaktyka powinna być prowadzona w grupie niemowląt i dzieci, szczególnie chodzących do żłobka, przedszkola lub szkoły, wyjeżdżających na kolonie, obozy. Szczepieniami powinno zostać również objęte starsze rodzeństwo niemowląt i małych dzieci uczęszczających do przedszkola lub szkół!



Pierwszą dawkę szczepionki można podać już po 2. miesiącu życia, jednak ze względu na różne schematy szczepień, można zacząć w późniejszym okresie, np. w wieku żłobkowym, przedszkolnym lub jeszcze później. W celu ustalenia odpowiedniego schematu zalecany jest kontakt z lekarzem rodzinnym.

Szczepienia realizowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego



MAŁOPOLSKA

Patroni medialni:



Gazeta Krakowska


rynekzdrowia.pl

Patronat honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Więcej informacji na www.profilaktykawmalopolsce.pl

Lekarz informuje

Dzieci do 1. roku życia najlepiej zaszczepić przeciw meningokokom serogrupy B, ponieważ w tej grupie wiekowej wywołują najwięcej zakażeń. Następnie zaleca się doszczepienie przeciw meningokokom C.



Szczepionka jest bezpieczna. Należy do kategorii szczepionek „zabitych” i zawiera niewielki fragment bakterii. W Polsce dostępne są szczepionki przeciwko meningokokom grupy B, oraz A, C, W, Y. Ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych jest niewielkie. Wśród reakcji, które mogą wystąpić po szczepieniu wymienia się zaczerwienienie, obrzęk, ból w miejscu wstrzyknięcia, rozdrażnienie, pogorszenie apetytu i stan podgorączkowyⁱ.

Źródła:

ⁱ Czajka H., Program polityki zdrowotnej dot. profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020 – 2027, Kraków 2019

ⁱⁱ Strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wotominie, <https://www.gov.pl/web/psse-wolomin/meningokoki> (dostęp 3.11.2021)

Szczepienia realizowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego



MAŁOPOLSKA

Patroni medialni:



Gazeta Krakowska

rynekzdrowia.pl

Patronat honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Więcej informacji na www.profilaktykawmalopolsce.pl